

RAPTORS AND RAT POISON

ADAR YSGLYFAETHUS A GWENWYN LLYGOD MAWR

Red Kites and other birds of prey such as Barn Owls, Kestrels and Buzzards occasionally fall victim to rodenticides by picking up dead and dying rats.



Ambell waith mae'r barcud coch ac adar ysglyfaethus eraill fel y dylluan wen, y cudyll coch a'r boda yn cael eu lladd gan wenwyn llygod drwy fwyta llygod mawr sy'n marw neu wedi marw.

How can I reduce this risk if I need to use poison?

- Plan well ahead. Deter rats by keeping sites clear of rubbish and spillage of feedstuffs.
- Proof buildings to keep out rodents
- Use older-type rodenticides such as Warfarin as they pose a smaller risk to raptors. If you suspect resistance, seek advice on the best product to use.
- Read the product label and follow it. Some poisons such as Brodifacoum may only be used indoors.
- Carry out a thorough site survey so you know how many baits are needed and where to place them.
- Protect poison bait from pets, domestic stock, wildlife and small children.
- Keep outside baiting to a minimum and remove uneaten bait at the end of the treatment
- Search for rodent bodies during and after treatment and burn or bury them

Should I report dead raptors?

If you suspect poisoning, please call:
Welsh Government on
Freephone 0800 321600

Sut alla i leihau'r perygl hwn os bydd yn rhaid defnyddio gwenwyn?

- Cynllunio ymhell ymlaen llaw. Cadwch lygod mawr i ffwrdd drwy gadw safleoedd yn glir o sbwriel a bwyd.
- Selio adeiladau i gadw llygod allan.
- Defnyddio gwenwyn llygod o'r math hwn fel Warffarin gan eu bod yn berygl llai i adar ysglyfaethus. Os ydych yn amau bod y llygod yn gallu gwrthsefyll hwn, ceisiwch gyngor ar y cynnyrch gorau i'w ddefnyddio.
- Darllen y label ar y cynnyrch a'i ddilyn. Dim ond dan do y gellir defnyddio rhai gwenwynau fel Brodifacoum.
- Cynnal arolwg trwyadl o'r safle er mwyn ichi wybod sawl abwyd sydd ei angen a ble i'w osod.
- Diogelu anifeiliaid anwes, stoc domestig, bywyd gwylt a phlant bach rhag abwyd gwenwynig.
- Rhoi cyn lleied â phosibl o abwyd y tu allan a symud abwyd heb ei fwyta ar ddiwedd y driniaeth.
- Chwilio am lygod marw yn ystod y driniaeth ac ar ôl hynny a'u llosgi neu eu claddu.

A ddylwn i roi gwybod am adar ysglyfaethus sydd wedi marw?

Os ydych yn amau eu bod wedi'u gwenwyno, ffoniwch:
Llywodraeth Cymru ar
Radffôn 0800 321600